



Cómo administrar Clexane® correctamente


- 1** Compruebe el nombre del fármaco y la dosis prescrita por su médico.




- 2** Lávese las manos.



- 3** Lugares recomendados para la inyección subcutánea.




- 4** Limpie sin frotar la zona donde va a realizar la punción con agua y jabón o con un algodón impregnado en alcohol.




- 5** Siéntese o tumbese en una posición cómoda.




- 6** Retire el capuchón de la aguja de la jeringa tirando de él. No presione el émbolo para eliminar las burbujas de aire.




- 7** Coja un pliegue en la piel (pellizco), inyecte la aguja a 90 grados y administre lentamente el fármaco durante 10-30 segundos.



- 8** Extraiga la aguja y suelte el pliegue.




- 9** Deseche la jeringa en un contenedor rígido, como por ejemplo, una botella de plástico.



Consejos de conservación y uso

No conservar a temperatura superior a 25°C. **No congelar.**



No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

CAD: MES-AÑO

No utilice este medicamento si observa una fisura en la jeringa, partículas en suspensión en la disolución, o un color diferente al habitual.



Para pacientes en tratamiento con Clexane®. No sustituye el consejo de su médico

SANOFI